

AIDE-MÉMOIRE

GESTION D'UNE ÉCLOSION DE GASTRO-ENTÉRITE

VOLET COMMUNAUTÉ ET SANTÉ MENTALE

DÉFINITION ÉCLOSION

- Une écloison se définit par la survenue de 2 cas nosocomiaux ou plus d'un même virus parmi les usagers, liés épidémiologiquement (dans un délai et un lieu donné);
- En présence d'une écloison, des mesures particulières doivent être mises en place pour limiter la transmission du pathogène en cause.

CARACTÉRISTIQUES

Gastro-entérite :

- Peut survivre jusqu'à 12 jours sur les surfaces;
- Peut survivre jusqu'à 4 heures sur la peau;
- Période d'incubation 15-48 heures;
- Contagion jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes.

MESURES À APPLIQUER

- Maintenir les usagers sur l'unité de soins;
- Désinfecter les mains des usagers avant et après chaque repas;
- Changer la literie quotidiennement pour les usagers symptomatiques ;
- Effectuer jusqu'à 10 prélèvements de selle pour recherche Norovirus, Rotavirus et Adénovirus;
- Compléter la grille de suivi des symptômes des usagers symptomatiques* et faire une note au dossier;
- Exercer une surveillance accrue de l'apparition des symptômes auprès des autres usagers de l'unité de soins;
- Rehausser l'hydratation et débiter diète gastro dès l'apparition de symptômes;
- S'assurer que la lingerie et le matériel requis sont disponibles en quantité suffisante;
- Cesser la participation aux activités de loisirs des usagers de l'unité touchée;
- Désinfection des équipements de soins et autres appareils entre chaque usager avec lingettes désinfectantes;
- Nettoyer et désinfecter (jour-soir-nuit) tout dégât ou souillure sans délai;
- Si un usager asymptomatique nécessite un transfert sur une unité de soins exempte d'écloison, aviser la PCI
- Établir des horaires pour le fumoir au besoin;
- Les bains des usagers en isolement sont annulés, les soins d'hygiène se font à la chambre;
- Lors d'une levée d'isolement, l'équipe d'hygiène salubrité enlèvera et désinfectera l'affiche (après la désinfection terminale de la chambre).

CLIENTÈLE ERRANTE

- Augmenter la fréquence d'hygiène des mains des usagers;
- Si un usager symptomatique ne respecte pas les mesures d'isolement, augmenter la fréquence d'hygiène des mains et désinfecter régulièrement l'environnement où il a circulé à l'aide de lingettes désinfectantes.

MESURES EN HYGIÈNE & SALUBRITÉ

Effectue « HIGH TOUCH » pour les situations suivantes :

- 1X / jour** : Toilettes des usagers asymptomatiques;
- 2X / jour** : Chambres en isolement, chaises d'aisances et toilettes;
- Minimum 3X / jour** : Toilettes communes;
- 3X / jour** : Aires communes (salle à manger, salon), poste infirmier et fumoir;
- ASI** : S'assurer que le poste n'est pas trop encombré pour permettre la désinfection.

FIN DES MESURES D'ÉCLOSION

- Décision par la conseillère en PCI, **96 heures** après la fin des symptômes du dernier cas;
- Aviser le service d'hygiène et salubrité pour une désinfection terminale de l'unité de soins;
- Reprise des activités normales seulement lorsque la désinfection de l'unité de soins est terminée.



AIDE-MÉMOIRE

GESTION D'UNE ÉCLOSION DE GASTRO-ENTÉRITE

VOLET COMMUNAUTÉ ET SANTÉ MENTALE

COMMUNICATION

- Se référer auprès de la conseillère en PCI avant de cesser les mesures d'isolement d'un usager et l'aviser de tout nouveau cas symptomatique;
- Coordo/ Chef d'unité** : S'assurer que tous les services concernés sont avisés de l'écllosion en cours (Physio, ergo, loisirs, infirmière en soins de pieds etc.);
- Coordo/ Chef d'unité** : S'assurer que les familles sont avisées de la survenue de l'écllosion et les inviter à restreindre leur visite le plus possible. (*Appels téléphoniques aux familles en période d'écllosion**);
- ASI / Chef d'unité** : Lorsqu'un visiteur se présente l'informer sur l'importance de l'EPI, de l'hygiène des mains et de limiter sa circulation sur l'unité touchée;
- ASI / Chef d'unité** : Au début de chaque quart de travail effectuer des rappels et attribution de tâches auprès du personnel soignant (*Rappel généraux lors d'écllosion**);
- ASI** : Avise le service alimentaire qu'une écllosion est en cours et que les usagers devront manger à l'étage;
- * **Chemin intranet et lien pour les documents du SPCI** :
 - ✓ Soins et services/ services professionnels/ prévention des infections
 - ✓ <http://intranetcemtl.cemtl.rtss.qc.ca/index.php?id=2556>

GESTION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

- Éviter la circulation sur d'autres unités qui ne sont pas en écllosion à l'exception des infirmières;
- Chef d'unité** : Évaluer la pertinence de maintenir les stagiaires sur l'étage en écllosion en collaboration avec la PCI;
- ASI / Chef d'unité** : Placer en cohorte (dédier) du personnel soignant régulier avec les usagers symptomatiques autant que possible;
- ASI** : Personnel symptomatique référer à son chef d'unité;
- ASI** : Surveillance du respect des mesures d'isolement et de l'hygiène des mains;
- ASI** : Supervision active des tâches réalisées selon le document : *Rappels généraux lors d'écllosion**.

Mise à jour : 2018-09-25

