

## ALGORITHME DÉCISIONNEL **C.DIFFICILE** VOLET COMMUNAUTÉ/SANTÉ MENTALE

### SIGNES ET SYMPTÔMES

#### ≥ 3 Selles liquides ou semi-liquides / 24 heures

(Absence de cause connue) **et** autres symptômes possibles :

- Odeur para-crésol (crottin de cheval)
- Fièvre
- Crampes abdominales
- Illéus
- Possibilité de mucus ou glaire

#### Causes possibles :

- Changement dans l'alimentation
- Intolérance alimentaire
- Médication récente (ex : antibiotique hypoglycémiant, laxatif)
- Maladie affectant le tractus intestinal

### FACTEURS DE RISQUE

#### FACTEURS DE RISQUE

- ✓ Hospitalisation dans les 8 dernières semaines
- ✓ Antibiothérapie actuelle ou < 3 derniers mois
- ✓ Antécédent de diarrhée à *C. difficile*
- ✓ 65 ans et +
- ✓ Immunosuppression, chimiothérapie
- ✓ Maladie chronique, chirurgie digestive, prise d'inhibiteurs de pompe à protons

### ISOLEMENT ET PRÉLÈVEMENT

#### ISOLEMENT

- Précautions additionnelles « **CONTACT +** »
- Compléter la feuille de suivi des selles et symptômes de *C. difficile*
- Aviser la conseillère en PCI
- Prélèvement sur selles semi-liquides ou liquides (les selles formées seront rejetées par le laboratoire)
- SI POSITIF** aviser le médecin et se référer à l'algorithme « traitement de l'infection à *Clostridioïdes difficile* (*C. difficile*) » du CIUSSS, disponible sur Intranet dans [Soins et services/Services professionnels/Programme d'Antibio Gouvernance \(PRAG\)](#)

#### AFFICHE



### MESURES À APPLIQUER

#### PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

- Affiche « **PRÉCAUTIONS CONTACT +** »
- Port de la blouse à manches longues, des gants et hygiène des mains **OBLIGATOIRE AVEC EAU ET SAVON**
- Renforcer l'hygiène des mains des usagers aussi avec **EAU ET SAVON**
- Changer la literie et les vêtements quotidiennement
- Chambre double : tirer le rideau. Le voisin de chambre n'est pas isolé
- Toilette ou chaise d'aisance dédiée avec enveloppe hygiénique
- Matériel dédié, chariot linge et déchets dans la chambre
- Rehausser la désinfection du matériel partagé avec des lingettes désinfectantes à base de chlore
- Désinfection quotidienne par l'équipe d'hygiène et salubrité
- Enseignement usager/famille : hygiène des mains avec **EAU ET SAVON** et respect du port de l'équipement de protection individuel (ÉPI).

### FIN DES MESURES

#### FIN DE L'ISOLEMENT DE L'USAGER

- 72 heures après le retour des selles habituelles pour l'usager
- La durée pourrait être prolongée selon les recommandations de la PCI
- Désinfection de la chambre et lavage du rideau séparateur si chambre double
- Désinfection du matériel et des équipements de soins non jetables avec des lingettes désinfectantes à base de Chlore.

