

ALGORITHME DÉCISIONNEL GASTRO-ENTÉRITE * VOLET COMMUNAUTÉ/SANTÉ MENTALE

SIGNES ET SYMPTÔMES

APPARITION BRUSQUE DE SYMPTÔMES :

- Nausées
- Vomissements
- Selles liquides ou semi-liquides
- Fièvre
- Crampes abdominales

OBSERVATION ET/OU ISOLEMENT

1 SYMPTÔME

ÉVALUATION CLINIQUE :

- État général
- Signes vitaux
- Alimentation (diète, gavage, etc.)
- Laxatifs (ex. suppositoire, protocole de constipation, etc.)
- Médicaments
- Antécédents médicaux (ex. maladie de Crohn, problème gastro-intestinal, etc.)

2 SYMPTÔMES ET +

- Évaluation clinique
- Précautions additionnelles **:contact/gouttelettes
- Compléter la grille de surveillance
- Aviser la conseillère en PCI

APPARITION D'UN 2^E SYMPTÔME

PRÉLÈVEMENT

- 2e cas de gastro-entérite en 48 heures** : Prélèvement (spécimen de selles ou de vomissements, spécifier sur la requête **NOROVIRUS, ADÉNOVIRUS, ROTAVIRUS** et mentionner **ÉCLOSION**)
- Inscrire dans la grille de surveillance les informations des prélèvements
- Envoyer un maximum de 5 à 10 prélèvements par éclosion

MESURES À APPLIQUER

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES**

- Affiche Contact/Gouttelettes
- Port de la blouse à manches longues, des gants et du masque
- Hygiène des mains des usagers et du personnel selon les 4 moments
- Chambre double : tirer le rideau, **voisin isolé**
- Toilette ou chaise d'aisance dédiée avec enveloppe hygiénique
- Matériel dédié, chariot linge dans la chambre
- Rehausser la désinfection du matériel partagé avec des lingettes désinfectantes, respecter le temps de contact
- Enseignement usager/famille : hygiène des mains et port de l'équipement de protection individuel(ÉPI).
- Après 2 cas sur la même unité en 96 heures et ayant un lien épidémiologique, **L'UNITÉ EST POTENTIELLEMENT EN ÉCLOSION. Cette situation doit être validée par une conseillère en PCI ou un gestionnaire. La tenue de certaines activités de groupe doit être évaluée.**

FIN DES MESURES

FIN DE L'ISOLEMENT DE L'USAGER

- 48 heures après la fin des symptômes
- Aviser le service d'hygiène salubrité pour désinfection de la chambre
- Sortir l'usager de la chambre lorsque possible
- Défaire le lit par le PAB
- Nettoyer et désinfecter le matériel et les équipements de soins non jetables avec des lingettes désinfectantes, respecter le temps de contact

FIN DE L'ÉCLOSION

- Décision par la conseillère en PCI, **96 heures** après la fin des symptômes du dernier cas
- Aviser le service d'hygiène et salubrité pour une désinfection terminale de l'unité de fin d'éclosion
- Reprise des activités seulement lorsque la désinfection de l'unité est terminée

