

ALGORITHME DÉCISIONNEL SYNDROME D'ALLURE GRIPPALE (SAG) *

VOLET COMMUNAUTÉ/SANTÉ MENTALE

SIGNES ET SYMPTÔMES

APPARITION BRUSQUE DE SYMPTÔMES :

- Fièvre, frissons
- Toux
- Céphalée
- Mal de gorge
- Arthralgie, myalgie, douleurs thoraciques parfois intenses
- Fatigue, diminution de l'état général, confusion
- Dyspnée
- Voix rauque
- Écoulement nasal

1 SYMPTÔME

2 SYMPTÔMES ET +

OBSERVATION ET/OU ISOLEMENT

ÉVALUATION CLINIQUE :

- État général
- Signes vitaux
- Auscultation pulmonaire
- Antécédents médicaux : MPOC, pneumonie d'aspiration, autres conditions pulmonaires

- Évaluation clinique
- Précautions additionnelles** : contact/gouttelettes
- Compléter la grille de surveillance
- Aviser la conseillère en PCI

APPARITION D'UN 2^E SYMPTÔME

PRÉLÈVEMENT

- 2^e cas de SAG en 10 jours**: Prélèvement du 2^e cas et du premier si SAG présent depuis moins de 72hrs
- Prélèvement via écouvillon velouteux (**voir MSI : Prélèvement des sécrétions nasopharyngées avec un écouvillon velouteux (flocké) ou procédure**)
- Inscrire dans la grille de surveillance les prélèvements effectués avec la date
- Envoyer jusqu'à 5 prélèvements ou plus selon la conseillère en PCI

MESURES À APPLIQUER

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES**

- Affiche Contact/Gouttelettes
- Port de la blouse à manches longues, des gants et du masque
- Hygiène des mains des usagers et du personnel selon les 4 moments
- Chambre double : tirer le rideau, **voisin isolé**
- Toilette ou chaise d'aisance dédiée avec enveloppe hygiénique
- Matériel dédié, chariot linge dans la chambre
- Rehausser la désinfection du matériel partagé avec des lingettes désinfectantes, respecter le temps de contact
- Enseignement usager/famille : hygiène des mains et port de l'équipement de protection individuel (ÉPI).
- Après 2 cas sur la même unité en 10 jours et ayant un lien épidémiologique, **L'UNITÉ EST POTENTIELLEMENT EN ÉCLOSION. Cette situation doit être validée par une conseillère en PCI ou un gestionnaire. La tenue de certaines activités de groupe doit être évaluée.**

FIN DES MESURES

FIN DE L'ISOLEMENT DE L'USAGER

- 5 à 7 jours après le début des symptômes ou jusqu'à la fin des symptômes selon la plus longue des 2 éventualités
- Aviser le service d'hygiène salubrité pour désinfection de la chambre
- Sortir l'usager de la chambre lorsque possible
- Défaire le lit par le PAB
- Nettoyer et désinfecter le matériel et les équipements de soins non jetables avec des lingettes désinfectantes, respecter le temps de contact

FIN DE L'ÉCLOSION

- Décision par la conseillère en PCI, **10 jours** après le début des symptômes du dernier cas
- Aviser le service d'hygiène et salubrité pour une désinfection terminale de l'unité de fin d'écllosion
- Reprise des activités seulement lorsque la désinfection de l'unité est terminée

